Травма

1. Потерпілий в автомобільній катастрофі доставлений в клініку нейрохірургії, оскільки були наявними ознаки черепно-мозкової травми. Під час огляду виявлені симптоми вогнищевого ушкодження мозку, запідозрено його забій. Який метод дослідження слід застосувати в даному випадку?
A. Комп'ютерна томографія
B. Рентгенографія кісток черепа
C. Ангіографія судин головного мозку
D. Ультразвукове дослідження судин головного мозку
E. Обстеження очного дна

2. Чоловік 38-ми років під час падіння з висоти двох метрів ударився головою об металевий предмет, короткочасно знепритомнів. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення, виділення крапель світлої рідини з правого носового ходу. Об'єктивно: симптом "окулярів", ретроградна амнезія. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Яка найбільш імовірна причина назальної ліквореї?
A. Запалення слизової оболонки носа
B. Забій головного мозку
C. Лікворна гіпертензія
D. Перелом основи черепу
E. Порушення відтоку ліквору

3. 7-ми річну дитину госпіталізовано до клініки з переломом верхньої щелепи після автокатастрофи. Непритомніючи, дитина блювала. Через 2 години опритомніла, відповідала на запитання, але через 4 години розвинувся сопор. Об'єктивно: Ps- 180/хв., судомні скорочення лівих кінцівок, анізокорія. Який основний діагноз?
A. Дислокаційний синдром
B. Забій головного мозку
C. Перелом основи черепа
D. Струс головного мозку
E. Епідуральна гематома

Епілепсія

1. Жінка 40-ка років з 15-ти років страждаєна епілепсію з генералізованими епінападами, які виникають 2-3 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиділенням та дефекацією. Після психотравми (смерть батька) напади почастішали, виникають з періодичністю 2–3 хвилини, між нападами до свідомості не повертається, реакція зіниць на світло відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Епілептичний статус
B. Істеричний напад
C. Збільшення кількості великих епінападів
D. Абсанс
E. Епілептичний психоз

2. У хлопчика 10-ти років періодично виникають короткочасні стани (до 10-15 секунд) у вигляді "раптового від ключення", які супроводжуються зупинкою і фіксацією погляду у прямому положенні, відсутнім беззмістовним виразом обличчя, зупинкою рухів та наступною амнезією. Який найбільш імовірний стан описано?
A. Абсанс
B. Обнубіляція
C. Транс
D. Фуга
E. Шперрунг

3. У хворого 30-ти років раптова непритомність, тоніко-клонічні судоми, АТ- 150/100 мм рт. ст., ЧСС- 100/хв. Перед нападом відчував запаморочення, почуття нереальності дійсності, непояснене почуття страху, про напад судом не пам'ятає. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Транзиторна ішемічна атака
B. Епілепсія
C. Вестибулярне зомління
D. Гіпервентиляційна ішемічна атака
E. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

4. Хворий 28-ми років доставлений бригадою швидкої допомоги до приймального відділення у непритомному стані з генералізованими епілептичними нападами, що повторюються через 15-20 хвилин. Під час транспортування хворому двічі вводились сибазон, сірчанокисла магнезія, однак рівень свідомості не відновився. У якому відділенні необхідно надавати невідкладну допомогу?
A. Хірургічне
B. Реанімаційне
C. Терапевтичне
D. Психіатричне
E. Неврологічне

5. Було помічено, що 7-ми річний школяр під час уроків по кілька разів ставав неуважним. Вчитель звернув увагу на "відсутній" погляд у дитини, прицмокування губами. Падіння та судом не спостерігалося. Під час короткої "відсутності" він не відгукувався на своє ім'я. Мати помічала такі ж явища і раніше, але не надавала їм значення, вважаючи, що дитина замислилася. Який тип епілептичного нападу, відповідно до прийнятої класифікації, найбільш вірогідний?
A. Простий парціальний напад
B. Складний парціальний напад
C. Генералізований тоніко-клонічний напад
D. Абсанс
E. Джексонівський парціальний напад

6. Хворий 37-ми років госпіталізований до реанімаційного відділення у зв'язку з повторюваними кожні півгодини судомними тоніко-клонічними нападами. Між нападами до свідомості не приходить. АТ- 120/90 мм рт.ст., Ps- 100/хв. Вчора ввечері був на весіллі, вживав алкоголь. 5 років тому переніс закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, після чого виникли поодинокі судомні напади з втратою свідомості, однак хворий курс протиепілептичного лікування не проходив. Який препарат необхідно першочергово ввести для надання невідкладної допомоги?
A. Сибазон
B. Сульфат магнію
C. Оксибутират натрію
D. Аміназин
E. Тіопентал натрію

7. Жінка 52-х років госпіталізована до відділення невідкладної терапії з епілептичним нападом. Першою дією під час надання допомоги в даному випадку є:
A. Упевнитися у прохідності дихальних шляхів та достатній оксигенації пацієнтки
B. Викликати медикаментозну пентобарбіталову кому
C. Ввести 5 мг діазепама з послідуючим введенням фенітоїну
D. Ввести в/в струминно 50\% розчин декстрози
E. Зафіксувати язик

Головний біль
1. Жінка 29-ти років скаржиться на періодичний біль в правій половині голови, який провокується різкими запахами, хвилюванням. На подібне захворювання страждає мати хворої. Внутрішні органи - без патології. Під час нападу спостерігається загальна гіперестезія, нудота, а в кінці - поліурія. При пальпації правої скроневої артерії під час нападу відмічається її напруженість і болючість. Загальні аналізи крові та сечі без особливостей. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Неврит лицевого нерву

B. Невралгія трійчастого нерву
C. Епілепсія
D. Синдром Меньєра
E. Мігрень

Пухлини

1. Хвора 43-х років протягом п'яти місяців скаржиться на біль голови, переважно у ранковий час, блювання. За останній час біль посилювався при зміні положення голови. Об'єктивно: аностія, застій сосочків зорових нервів, атаксія, симптом Янішевського, зниження пам'яті та критики. Краніограма: ознаки гіпертензіонно-лікворного синдрому. На ЕхоЕГ: зміщення серединних структур мозку в правий бік на 5 мм. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Пухлина лівої півкулі мозочка
B. Хвороба Альцгеймера
C. Абсцес потиличної частки головного мозку
D. Хронічна недостатність мозкового кровообігу
E. Пухлина лобної частки головного мозку

Автономна нервова система

1.Хлопчик 12-ти років скаржиться на періодичний головний біль, серцебиття, дратівливість, непереносимість поїздок у транспорті. Скарги турбують 2 місяці. За цей час тричі відмічались напади підйому артеріального тиску до 140/100 мм рт.ст., це супроводжувалось підйомом температури до 38°С, тахікардією, тремором, відчуттям страху. Закінчувався напад значним сечовипусканням. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Вегетативна дисфункція
B. Епілепсія
C. Вроджена вада серця
D. Пухлина мозку
E. Міокардит

2. У дівчини 19-ти років, емоційно лабільної, у задушливому приміщенні розвинулись різка слабкість, запаморочення, потемніння в очах, нудота і втрата свідомості без судом. Об’єктивно: непритомна, шкіра бліда, кінцівки холодні. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 96/хв., зниженого наповнення, дихання поверхневе. Зіничні та сухожилкові рефлекси збережені. Патологічних знаків немає. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Синкопальний стан
B. Вегетативно-судинний пароксизм
C. Епілептичний напад
D. Істеричний невроз
E. Транзиторна ішемічна атака

3 Хвора 34-х років біля двох років страждає на тривожні розлади з панічними атаками. Лікувалась у психотерапевта. Було досягнуто неповної ремісії. В зв'язку з переїздом в інше місто перервала психотерапію. Невдовзі стан значно погіршився, почуває майже постійну тривогу. Панічні напади до 5-6 разів на день, супроводжуються сильним серцебиттям, задишкою, холодним потом, страхом смерті. Яка група препаратів є найбільш доцільною для медикаментозної терапії?
A. Нейролептики седативної дії
B. Кардіотоніки, дихальні аналептики
C. Антидепресанти
D. Нейролептики антипсихотичної дії
E. Препарати літію

4 У дитини 14-ти років, що страждає на вегето-судинну дистонію пубертатного періоду, розвинулася симпатоадреналова криза. Який з препаратів показаний для купірування кризи?
A. Корглікон
B. Еуфілін
C. Но-шпа
D. Амізил

E. Обзидан

Розсіяний склероз

1. Хвора 25-ти років скаржиться на значне зниження зору на праве око, що виникло раптово. При обстеженні окуліста: ознаки ретробульбарного невриту. Об’єктивно: черевні рефлекси відсутні, вібраційна чутливість знижена. Встановіть діагноз:
A. Розсіяний склероз
B. Бічний аміотрофічний склероз
C. Фунікулярний мієлоз
D. Пухлина головного мозку
E. Атрофія зорових нервів

2 Чоловік 25-ти років, який 4 роки хворіє на розсіяний склероз, скаржиться на посилення хиткості, слабкість нижніх кінцівок, затримку сечі. Об'єктивно: центральний тетрапарез. Мозочкова атаксія. Порушення функції тазових органів. Яка найбільш доцільна терапія в цьому випадку?
A. Вітаміни
B. Ноотропи
C. Десенсибілізуючі
D. Антибіотики
E. Глюкокортикоїди

Судинні захворювання

1. Хворий 30-ти років, який страждає на головні болі, при піднятті важкого предмету відчув сильний головний біль у вигляді удару по голові; з’явились нудота, блювання, легке запаморочення. Через добу - об’єктивно виражений менінгеальний синдром, температура тіла - 37, 6°С. Лікар запідозрив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?
A. Люмбальна пункція з дослідженням ліквору
B. Рентгенографія черепа
C. Комп’ютерна томографія
D. Реоенцефалографія
E. Церебральна ангіографія

2. Хворий 39-ти років при підйомі вантажу раптово відчув сильний головний біль, біль у міжлопатковій ділянці; виникло блювання. Об’єктивно: пульс ритмічний, 60/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст. Хворий збуджений. Світлобоязнь, гіперакузія. Позитивні симптоми Керніга, Брудзинського з обох сторін. У крові: лейк.- 10 · 109/л. Ліквор кров’янистий, цитоз 240/3. Який з діагнозів найбільш імовірний?
A. Субарахноїдальний крововилив
B. Симпато-адреналовий криз
C. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
D. Менінгококовий менінгіт
E. Ішемічний інсульт

3 Чоловіка 34-х років доставлено до неврологічного відділення зі скаргами на інтенсивний головний біль, двоїння в очах при погляді прямо, нестерпність світла та шуму. Захворів гостро, напад стався під час підняття вантажу. Об'єктивно: оглушення, помірна розбіжна косоокість, диплопія. Симптоми Керніга з обох боків. Парезів немає. Ліквор кров'янистий. Який препарат треба призначити в першу чергу?
A. Ацетилсаліцилова кислота
B. Гепарин
C. Епсілон-амінокапронова кислота
D. Глютамінова кислота
E. Нікотинова кислота

4 У новонародженого терміном гестації 31 тиждень наростає млявість, м'язова гіпотонія та пригнічення свідомості. Аналіз ліквору: підвищена кількість еритроцитів, білка та

підвищений вміст глюкози. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Анемія
B. Внутрішньоутробна інфекція
C. Внутрішньочерепний крововилив
D. Менінгіт
E. Сепсис

5 У хворого 39-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово виникли інтенсивний головний біль в потилиці, нудота і повторне блювання, що тривають п'яту годину. Об'єктивно: Ps- 88/хв, АТ- 205/100 мм рт.ст., болючість окципітальних точок, ригідність потиличних м'язів. Симптом Керніга позитивний з обох боків. Є підозра на субарахноїдальний крововилив. Який з нижче наведених методів дослідження має вирішальне значення для підтвердження попереднього діагнозу?
A. Комп'ютерна томографія
B. Ультразвукова доплерографія
C. ЕЕГ
D. Поперековий прокол
E. Дослідження очного дна

6 Жінка 60-ти років близько 15-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію. Після повторного інсульту скаржиться на немотивоване зниження настрою, важкість зосередження уваги, забуває зачиняти вхідні двері, не пам'ятає події минулого дня. На КТ- ділянки постінфарктних змін в коркових задньолобових ділянках. Який діагноз найбільш вірогідний у хворої?
A. Хвороба Гентінгтона
B. Судинна деменція
C. Хвороба Альцгеймера
D. Хвороба Піка
E. Дисоціативна амнезія

7 Жінка 75-ти років з ІХС постійно приймає варфарин. Госпіталізована до відділення невідкладної терапії зі скаргами на раптову появу слабкості у лівій половині тіла і відхилення очного яблука в правий бік. Яке першочергове дослідження слід провести пацієнтці?
A. Спинальна пункція
B. Електроенцефалограма
C. Ультразвукове дослідження сонних артерій
D. Комп'ютерна томографія мозку
E. МРТ мозку

8 У хворого 60-ти років протягом місяця відмічалося короткочасне зниження сили у лівих кінцівках. Пізніше вранці після сну з'явилася стійка слабкість у кінцівках. Об'єктивно: притомний, АТ- 140/90 мм рт.ст., центральний парез VII та XII пар черепних нервів зліва, з того ж боку центральний геміпарез та гемігіперестезія. Які препарати вибору при диференційованому лікуванні даного хворого?
A. Гіпотензивні
B. Діуретики
C. Гемостатики
D. Антикоагулянти
E. Кортикостероїди

9. У хворого 50-ти років раптово виникли біль у потиличній ділянці, блювання. Об’єктивно: сопор, гіперемія шкіри обличчя, АТ- 210/120 мм рт.ст., Ps60/хв, напружений, температура тіла 37, 8°С. Горизонтальний ністагм. Виражені рефлекси орального автоматизму. Сухожилкові рефлекси рівномірні. Ригідність потиличних м’язів, двобічний симптом Керніга. Який попередній діагноз?
A. Субарахноїдальний крововилив
B. Геморагічний паренхіматозний інсульт

C. Субдуральна гематома
D. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
E. Менінгококовий менінгіт

Інфекційні захворювання

1. Госпіталізовано дитину 8-ми років із скаргами на підвищення температури тіла до 39, 8°С, млявість, помірний головний біль, блювання. При огляді виявлені менінгеальні симптоми. Проведено люмбальну пункцію. Отримано рідину під підвищеним тиском, прозору, цитоз 450 клітин в 1 мкл (переважно лімфоцити – 90%), вміст глюкози 2,6 ммоль/л. Яким збудником може бути викликано захворювання у дитини?
A. Ентеровірус
B. Менінгокок
C. Туберкульозна паличка
D. Стафілокок
E. Пневмокок

2. У дитини 2,5 років на 15-у добу після контакту з хворим на поліомієліт з'явились помірні катаральні прояви у вигляді нежиттю та сухого покашлювання. На 2-у добу захворювання приєднались зниження апетиту, млявість, порушився сон. При огляді дитина вередлива, млява, м'язи потилиці ригідні, гіперестезії за ходом правого сідничного нерва, t - 38, 2°С. Який період розвитку паралітичної форми поліомієліту має місце в даної дитини?
A. Препаралітичний
B. Паралітичний
C. Відновний
D. Резидуальний
E. Інкубаційний

3. Хворий 20-ти років скаржиться на сильний головний біль, двоїння в очах, загальну слабкість, підвищення температури тіла, дратівливість. Об'єктивно: температура тіла 38, 1°С, в контакт вступає неохоче, болісно реагує на подразники. Птоз лівої повіки, розбіжна косоокість, анізокорія S>D. Виражений менінгеальний синдром. При люмбальній пункції ліквор витікав під тиском 300 мм вод.ст., прозорий, з легкою опалесценцією, через добу випала фібринозна плівка. Білок - 1,4 г/л, лімфоцити - 600/3 в мм3, цукор - 0,3 ммоль/л. Який попередній діагноз слід поставити хворому?
A. Туберкульозний менінгіт
B. Менінгококовий менінгіт
C. Лімфоцитарний менінгіт Армстронга
D. Сифілітичний менінгіт
E. Паротитний менінгіт

4. У чоловіка 24-х років на 5-й день респіраторного захворювання з високою температурою, посилився головний біль, з'явилися системне запаморочення, відчуття двоїння, парез мімічних м'язів справа, поперхування під час ковтання. Діагностований гостровірусний енцефаліт. Визначте основний напрямок невідкладної терапії:
A. Зовіракс
B. Глюкокортикоїди
C. Цефтріаксон
D. Лазикс
E. Гемодез

5. Хворий 27-ми років на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний біль, багаторазове блювання. Об'єктивно: стан важкий. У свідомості, адинамічний. В ліжку займає вимушене положення із запрокинутою головою. Шкіра без висипу. Виражені ригідність м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського. Температура 39, 5°С, Ps- 120/хв, АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провідний синдром захворювання?
A. Лікворна гіпертензія
B. Лікворна гіпотензія
C. Ураження ядер черепно-мозкових нервів

D. Крововиливи в надниркові залози
E. Гіпертермія

6 Дитина 1,5 років захворіла гостро: підвищилася температура до 39°С, з'явилося блювання до 5 разів. Дослідження нервової системи виявило позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Перераховані симптоми відносяться до:
A. Синдрому дискоординації
B. Енцефалічного синдрому
C. Ознак інфекційного токсикозу
D. Менінгеальних знаків
E. Синдрому рухових розладів

7 На 21-й день після появи везикульозного висипу при вітряній віспі у дитини 7-ми років з'явились атаксія, ністагм, інтенційний тремор, м'язова гіпотонія. У ліквoрі невисокий лімфоцитарний плеоцитоз, незначно збільшений рівень білку. Яке ускладнення розвинулось у даної дитини?
A. Гострий неврит
B. Пневмоніт
C. Постгерпетична невралгія
D. Енцефаліт
E. Гнійний менінгіт

8 У жінки 46-ти років через добу після початку грипу посилився головний біль, з'явилося запаморочення, нудота. Об'єктивно: свідомість збережена, психомоторне збудження, загальна гіперестезія, помірний менінгеальний синдром, ністагм. Сухожилкові рефлекси справа вище, понижена сила м'язів у правих кінцівках, справа патологічний рефлекс Бабінського. Ліквор: прозорий, тиск 220 мм вод.ст., помірний цитоз - 46,3*106/л, переважно лімфоцити. Який із діагнозів найбільш імовірний?
A. Бактеріальний менінгоенцефаліт
B. Субарахноїдальний крововилив
C. Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив
D. Грипозний менінгоенцефаліт
E. Ішемічний інсульт

9 Чоловік 38-ми років надійшов до лікарні у непритомному стані. Захворів учора: з'явився головний біль, нудота, блювання, to- 38,5°С, виникло запаморочення, марення. Протягом останніх 4-х днів скаржився на біль та зниження слуху на ліве вухо. Об'єктивно: стан сопорозний, ригідність потиличних м'язів, симптом Керніга з обох боків, загальна гіперестезія, гноєтеча з лівого вуха. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Вторинний гнійний менінгіт
B. Туберкульозний менінгіт
C. Первинний гнійний менінгіт
D. Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив
E. Субарахноїдальний крововилив

10 Дитина 3-х років захворіла гостро, підвищилася температура тіла до 39,50С, стала млявою, повторне блювання, головний біль. При огляді виявлені позитивні менінгеальні симптоми, проведена люмбальна пункція. Спинномозкова рідина каламутна, витікає під тиском, вміст білка - 1,8 г/л; реакція Панді +++, цукор - 2,2 ммоль/л, хлориди - 123 ммоль/л, цитоз – 2350*106 (80% нейтрофілів, 20% лімфоцитів). Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Серозний менінгіт вірусний
B. Серозний менінгіт туберкульозний
C. Гнійний менінгіт
D. Пухлина мозку
E. Субарахноїдальний крововилив

11 Дитина 8-ми років скаржиться на головний біль, блювання. Хворіє 1 день. Об'єктивно: t39,3°С, шкіра чиста, зів гіперемований, язик обкладений, кон'юнктивіт, склерит. Слабко

виражена ригідність м'язів потилиці. Позитивний симптом Керніга з правого боку. Ліквор: цитоз - 340, лімф.- 87\%, нейтроф.- 13\%, білок - 140 мг/л. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Гнійний менінгіт
B. Серозний менінгіт
C. Арахноїдит
D. Нейротоксикоз
E. Пухлина мозку

12 Дитина 1,5 років захворіла гостро, температура тіла - 38,5°C, біль голови, слабкість. На п'ятий день хвороби температура знизилася. Вранці у правій нозі виникли біль у м'язах, відсутність рухів та сухожилкових рефлексів; чутливість збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Поліатропатія
B. Вірусний енцефаліт
C. Остеомієліт
D. Поліомієліт
E. Артрит кульшового суглоба

Захворювання ПНС
1. У хворого, що страждає на цукровий діабет, раптово опустилася верхня повіка правого ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість справа. Інших змін в неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання виникло у хворого?
A. Невропатія правого окорухового нерва
B. Діабетична поліневропатія
C. Гостре порушення мозкового кровообігу
D. Пухлина головного мозку
E. Вторинний менінгіт

2. У новонародженого, що народився в результаті стрімких пологів, спостерігається парез м’язів кисті. Хапальний рефлекс відсутній, не вдається викликати долонно-ротовий рефлекс. Чутливість кисті відсутня. Який найбільшімовірний діагноз?
A. Парез Дежерін-Клюмпке
B. Парез Дюшена-Ерба
C. Тотальне ураження плечового сплетення
D. Парез діафрагми
E. Синдром Горнера-Бернара

3. У хворого 2 дні тому з’явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка та головний біль. Об’єктивно: зліва в 4-5 міжребер’ї на еритематозному фоні множинні згруповані пухирці, наповнені прозорим вмістом, 2-4 мм у розмірі. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика?
A. Оперізуючий герпес
B. Пухирчатка
C. Простий герпес
D. Стрептококове імпетиго
E. Герпетиформний дерматоз Дюрінга

4. У хворого після підняття вантажу виник нестерпний біль у попереку. Дільничний терапевт діагностував гострий попереково-крижовий радикуліт. Що з нижче перерахованого протипоказано хворому?
A. Зігріваючі процедури
B. Дегідратуючі засоби
C. Анальгетики
D. Вітаміни групи В
E. Внутрішньовенно еуфілін

5. Жінка 62-х років після підняття вантажу відчула гострий біль у поперековій зоні, сідниці, задньобоковій поверхні правого стегна, зовнішній поверхні правої гомілки та тильній поверхні стопи. Об’єктивно: слабкість переднього великогомілкового м’яза, довгого розгинача великого пальця, короткого розгинача пальців правої стопи. Знижений ахіллів рефлекс справа. Позитивний симптом Ласега. Який найбільш інформативний метод дослідження для уточнення діагнозу дискогенної компресії L5 корінця?
A. Магнітно-резонансне сканування
B. Рентгенографія хребта
C. Електроміографія
D. Ангіографія
E. Люмбальна пункція

6 До травмпункту звернувся пацієнт з травмою склом нижньої третини волярної поверхні передпліччя. Об'єктивно: порушено згинання IV та V пальців, знижена чутливість внутрішньої тильної та долонної поверхні кисті та IV пальця. Який нерв травмовано?
A. М'язово-кістковий
B. Серединний
C. Променевий
D. Ліктьовий
E. Пахвовий

7 У хворого 2 дні тому з'явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка та головний біль. Об'єктивно: зліва в 4-5 міжребер'ї на еритематозному фоні множинні згруповані пухирці, наповнені прозорим вмістом, 2-4 мм у розмірі. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика?
A. Оперізуючий герпес
B. Простий герпес
C. Герпетиформний дерматоз Дюрінга
D. Пухирчатка
E. Стрептококове імпетиго

8 Народилася дівчинка з оцінкою за шкалою Апгар на 1-5-й хвилинах 7-8 балів. Під час пологів спостерігалося короткочасне утруднення при виведенні плечового поясу. Після народження у дитини спостерігається порушення функції проксимального відділу та вимушене положення правої ручки. Плече повернуто досередини, лікоть розігнутий, відмічається пронація передпліччя, кисть зігнута у вигляді "руки ляльки". Який клінічний діагноз у даної дитини?
A. Внутрішньочерепний крововилив
B. Травма м'яких тканин правої ручки
C. Остеомієліт правої ручки
D. Травма грудного відділу хребта
E. Парез Дюшена-Ерба

9 У шахтаря 37-ми років після підняття вантажу виник біль у попереку, що іррадіює в ліву ногу. Хода щадна. Сплощений поперековий лордоз. Сколіоз випинанням вліво. Напруження паравертебральних м'язів. Позитивні симптоми Нері, Дежеріна, симптом Ласега зліва з кута 350 градусів. Зазначте необхідне дослідження для уточнення діагнозу:
A. Електроміографія
B. Люмбальна пункція
C. КТ попереково-крижового відділу хребта
D. Низхідна мієлографія
E. Сонографія нирок

10 Дитина народилася добу тому. У пологах утруднене виведення плечиків. Маса тіла 4300,0. Об'єктивно: права рука звисає вздовж тулуба, кисть пронована, рухи у руці відсутні. Позитивний симптом шарфа. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:
A. Проксимальний тип правобічного акушерського паралічу
B. Дистальний тип правобічного акушерського паралічу

C. Геміпарез
D. Тотальний правобічний акушерський параліч
E. Тетрапарез

11 Жінка 52-х років скаржиться на перекіс обличчя. Захворіла 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: температура 38,2°С. Відмічається асиметрія обличчя. Лобні складки з лівого боку згладжені. Ліве око ширше правого і не закривається. Згладжена ліва носогубна складка, опущений кут рота. Іншої патології не виявлено. В крові: лейк.- 10*109/л, ШЗЕ- 20 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Невралгія трійчастого нерва
B. Ішемічний інсульт
C. Неврит лицевого нерва
D. Пухлина мозку
E. Гемікранія (мігрень)

12 Жінка 45-ти років скаржиться на нападоподібний нестерпний біль у лівій половині обличчя тривалістю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла два місяці тому після переохолодження. Об'єктивно: біль у точках виходу трійчастого нерва зліва. Дотик біля крила носа зліва викликає черговий напад з тонічною судомою м'язів обличчя. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Гайморит
B. Невралгія трійчастого нерва
C. Лицева мігрень
D. Невралгія язикоглоткового нерва
E. Артрит нижньощелепного суглобу

13 Хвора 43-х років скаржиться на періодичні напади болю у ділянці правої половини обличчя. Під час нападу спостерігається спазм мімічної мускулатури правої половини обличчя, шкірні покриви на цьому боці обличчя червоніють. У крові - без патології. Було діагностовано невралгію трійчастого нерва з правого боку. Який препарат найбільш доцільно призначити?
A. Актовегін
B. Преднізолон
C. Анальгін
D. Фінлепсин
E. Індометацин

14 Чоловік 45-ти років, вантажник, скаржиться на біль у попереку та правій нозі. Ця симптоматика утримується 2 місяці та після курсу консервативної терапії не зменшилася. Об'єктивно: динаміка хребта у поперековому відділі обмежена, симптом Ласега позитивний праворуч. Колінні рефлекси D=S, жваві. Ахіллові: S>D, праворуч різко знижений. Яке обстеження треба виконати хворому для уточнення діагнозу?
A. Рентгенографія хребта
B. Електроміографія м'язів ніг
C. -
D. Реовазографія ніг
E. Магнітно-резонансна томографія

15 У 52-х річної хворої з поширеним остеохондрозом хребта, після підняття важкості, з'явився біль у попереку та по ходу лівого сідничного нерва. Об'єктивно: з лівого боку позитивний симптом Ласега і знижений ахілов рефлекс. Призначення якого препарату патогенетично найбільш виправдане?
A. Диклофенак
B. Спазмалгон
C. Новокаїн
D. Аспірин
E. Анальгін

16 У хворого 38-ми років після підняття вантажу з'явився біль в поперековому відділі хребта з іррадіацією по задній поверхні лівої ноги. Біль наростає при зміні положення тіла та у вертикальному положенні. Під час обстеження виявлені позитивні симптоми натягу. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Патологія міжхребцевих дисків
B. Мієлопатія
C. Арахноміеліт
D. Поліневрит
E. Пухлина спинного мозку

17. Хворому було виконано резекцію шлунка. Під час операції ліва верхня кінцівка хворого була відведена і зафіксована до операційного столу для виконання анестезіологічного забезпечення. В післяопераційному періоді у хворого з'явились порушення функції верхньої кінцівки у вигляді "звисаючої кисті". Пошкодження якого нерва привело до виникнення цього симптому?
A. Променевий нерв
B. Пахвовий нерв
C. Ліктьовий нерв
D. Серединний нерв
E. М'язово-шкірний нерв

18. У хворого, що страждаєна цукровий діабет, раптово опустилася верхня повіка правого ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість справа. Інших змін в неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання виникло у хворого?
A. Невропатія правого окорухового нерва
B. Діабетична поліневропатія
C. Гостре порушення мозкового кровообігу
D. Пухлина головного мозку
E. Вторинний менінгіт

19. У новонародженого, що народився в результаті стрімких пологів, спостерігається парез м'язів кисті. Хапальний рефлекс відсутній, не вдається викликати долонно-ротовий рефлекс. Чутливість кисті відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Парез Дежерін-Клюмпке
B. Парез Дюшена-Ерба
C. Тотальне ураження плечового сплетення
D. Парез діафрагми
E. Синдром Горнера-Бернара

20. Доношений новонароджений з масою тіла 4500 г народився в асфіксії з оцінкою за шкалою Апгар 4-6 балів. В пологах утруднене виведення плечового поясу. У неврологічному статусі загальномозкові розлади, виявлений тотальний верхній млявий парез – рука атонічна, пронована, не викликаються рефлекси - хапальний, Бабкіна, Моро. Укажіть сегменти ураження спинного мозку:
A. V - T hI
B. I - II
C. III - IV
D. T hI - T hV
E. T hV I - T hV

21. Хворий 48-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у попереку. Хворіє 3 дня після переохолодження. Після огляду лікар поставив діагноз: гострий поперково-крижовий радикуліт. Які ліки слід призначити хворому?
A. Нестероїдні протизапальні засоби
B. Кортикостероїди
C. Вітаміни
D. Антибактеріальні
E. Десенсибілізуючі

22. Гірничий робітник очисного вибою 37-ми років після довготривалого вимушеного зігнутого положення тулуба у шахті відчув інтенсивний, стріляючого характеру біль у поперековому відділі хребта, який поширювався вниз у ліву ногу до підколінної ямки. Рухи хребта у поперековій ділянці різко обмежені. Позитивний симптом Ласега зліва. Пальпаторна болючість паравертебральних точок L5-S1. Сухожилкові рефлекси на нижніх кінцівках – знижений лівий ахіловий рефлекс. Гіпотонія м'язів лівого стегна і гомілки. Встановіть попередній клінічний діагноз:
A. Попереково-крижова радикулопатія
B. Ниркова коліка
C. Спінальний інсульт
D. Перелом поперекового хребця
E. Транзиторна ішемічна атака

23. Хворого 60-ти років 2 дні турбував сильний біль у правій руці. На 3-й день з'явились пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка на шкірі плеча, передпліччя та кисті. Чутливість в ділянці висипань знижена. Яке захворювання найбільшімовірне?
A. Герпетичний гангліоніт
B. Дерматит
C. Шийно-грудний радикуліт
D. Псоріаз
E. Алергія

24 У новонародженого після патологічних пологів з першого дня життя відсутні активні рухи у правій руці. Стан порушений. Рефлекс Моро праворуч не викликається. Різко знижені сухожилково-періостальні рефлекси на ураженій руці. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Травматичний плексит, тотальний тип
B. Внутрішньочерепна пологова травма
C. Травматичний перелом правої плечової кістки
D. Остеомієліт правої плечової кістки
E. Травматичний плексит, дистальний тип